



Conseils pour la production de PdT de consommation

- Excellent profil gustatif
- Chair ferme
- Très adaptée aux marchés primeurs
- Tubercules réguliers en forme et calibre
- Bonne résistance aux coups bleus



Caractéristiques agronomiques

Maturité	76	Hâtive
Rendement précoce	92	Moyenne
Période de dormance	32	Courte
Rendement à maturité	90	Assez bonne
Grosseur du tubercule	73	Sous calibre
Forme		Long-ovale
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune foncé
Type de cuisson		A - Chair ferme
Matière sèche/Amidon %		18,3% / 12,5%
Poids sous l'eau/		331 / 1,07
Noircissement interne	4	Pas de sensibilité
Sens. au Metribuzin	60	● ● ● ● ● ●
Bouillage	81	● ● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Résistances

Mildiou du feuillage	33	● ● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	46	● ● ● ● ● ●
Alternaria	66	● ● ● ● ● ●
Gale commune	49	● ● ● ● ● ●
Gale poudreuse	57	● ● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	90	● ● ● ● ● ●
Virus Y	42	● ● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	68	● ● ● ● ● ●
Nématodes		
Ro1 9	● ● ● ● ● ●	
Ro2/3 8	● ● ● ● ● ●	
Pa2 *3	● ● ● ● ● ●	
Pa3	● ● ● ● ● ●	
Galle Verruqueuse		
F1 10	● ● ● ● ● ●	
F2 3	● ● ● ● ● ●	
F6	● ● ● ● ● ●	
F18 6	● ● ● ● ● ●	


* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété demi-précoce.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Des engrais à libération lente sont recommandés de façon à maintenir un cycle de culture plus long.
- Ne pas appliquer de chlorure de potasse (KCl) moins de 6 semaines avant la plantation, des apports trop tardifs pouvant induire des taux de matière sèche trop bas.
- La fumure organique aidera à maintenir une culture vigoureuse.
- Veiller à maintenir un feuillage vigoureux.



Conseils pour la production de PdT de consommation




Plantation

- ANNABELLE a une dormance courte.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- Lors du dégermage, éviter la condensation sur les tubercules.
- Si un plant a de longs germes, dégermer et laisser sécher avant plantation.
- ANNABELLE réagit bien à la coupe de gros calibres. Il est conseillé de couper 3-4 semaines avant plantation.
- Couper entraîne un risque d'infection. Désinfecter le couteau et utiliser du talc. Sécher rapidement pour une bonne cicatrisation. Pour des climats plus froids, couper 3-4 semaines avant plantation.
- Le traitement des plants et/ou du sol est conseillé pour contrôler le Rhizoctonia, la gale argentée et d'autres maladies telluriques affectant la peau. Appliquer de l'azoxystrobine sur le sol donne de bons résultats sur beaucoup de champignons.
- ANNABELLE peut être cultivée sur tous types de sols.
- Nous recommandons de planter ANNABELLE 3 cm plus profond que la normale pour renforcer le système racinaire et l'assimilation des nutriments.




Culture

- Appliquer une dose initiale d'azote importante si le développement du feuillage est faible.
- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Pour une bonne efficacité, adapter la dose de métribuzine en fonction des conditions Météo.
- ANNABELLE semble sensible au clomazone (Centium) seul ou combiné à d'autres herbicides.
- Une culture irriguée produira une récolte plus uniforme et de meilleure qualité culinaire.
- Une surfertilisation en azote peut entraîner une plus grande sensibilité au mildiou.
- Utiliser un programme de protection haut de gamme pour prévenir le mildiou sur le feuillage et les tubercules.



Défanage

- Viser une teneur en matière sèche de 19 %.
- Commencer le contrôle de la teneur en matière sèche environ 3 semaines avant la récolte.
- Porter une attention particulière au défanage pour obtenir la meilleure qualité culinaire.
- Pour une dormance optimale, défaner une culture sénescente.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte.
- ANNABELLE est assez résistante aux coups bleus (sauf en conditions extrêmes).
- Des micro-dommages lors de la récolte provoqueront une augmentation de la déshydratation en stockage et une germination plus précoce.



La conservation

- ANNABELLE est une variété précoce. Par conséquent, les ventes se font normalement dans les 5 mois suivant la récolte.
- Pour une période de conservation supérieure à 3 mois, un stockage réfrigéré est requis.
- STOCKAGE AU FRIGO
- Afin d'éviter une déshydratation importante, refroidir avec une faible amplitude thermique entre l'air de refroidissement et les tubercules.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
- Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée.