



Pestovateľský návod – konzumné zemiaky



Príprava sadiva a výsadba

- Stredná dormancia. Odroda znesie výsadbu sadiva s vyvinutými malými bielymi klíčkami.
- Pri výsadbe na pôdach so zvýšeným rizikom výskytu koreňomoru, odporúčame sadivo moriť.
- Pri pestovaní pre dlhodobé skladovanie, odporúčame aplikovať na pôdu pri výsadbe azoxystrobin (Amistar). Toto ošetrovanie znižuje riziko výskytu striebrosti šupky hlúž.
- Sadíme o 3-4 cm hlbšie, pretože CARRERA zakladá hľuzy pomerne plytko v pôde.
- Dokonalé hrobkovanie redukuje riziko výskytu zelených hlúž.




Pestovanie

- Najlepšie výsledky dosahuje CARRERA na pôdach s dobrou štruktúrou.
- Pre dobrý vývin vňate potrebuje vyššiu štartovaciú dávku dusíka aplikovanú pred výsadbou.
- Odroda je pomerne citlivá na Sencor, po vzídení prípravok aplikujte v nižších dávkach do výšky zemiakov max. 10 cm.
- Preventívne aplikujte prípravky proti alternárii (Signum). Prvýkrát v čase maximálneho kvitnutia a potom opakovane aplikujte každých 14 dní.
- Včas pravidelne a preventívne ošetríte porast proti plesni zemiakovej.
- Počas rastu vňate preventívne aplikujte najmä prípravky s účinnosťou aj proti alternárii, striedajte použité prípravky.
- Na konci ošetrovania proti plesni zemiakovej preferujte prípravky proti prenosu plesne na hľuzy.
- Dbajte na pravidelný prísun vody, aby sa predišlo nepravidelnému tvaru hlúž.
- Nie je vhodné aby hľuzy ku koncu rastu explozívne narástli – hrozí riziko vzniku fyziologických rozpraskov.



Ukončenie vegetácie

- CARRERA je citlivejšia na mechanické poškodenie hlúž pri zbere.
- Dbajte na správne nastavenie zberovej techniky.
- Zber v optimálnych zberových podmienkach redukuje výskyt mechanického poškodenia na hlúžach.
- Zamedzte pádom z výšky – redukuje tak výskyt mechanického poškodenia hlúž.



Skladovanie

- CARRERA je veľmi skorá odroda a jej predaj sa zvyčajne končí do 5 mesiacov od zberu.
- Ak sa zberalo za dobrých podmienok, schladzovanie môže začať ihneď po osušení hlúž.
- Pre skladovanie dlhšie ako 3 mesiace je potrebné použiť klimatizované sklady.

Odporúčania pre KLIMATIZOVANÉ SKLADY :

- Rozdiel teploty chladenia a teploty hlúž by nemal byť väčší ako 4°C. V opačnom prípade sa zvyšuje riziko dehydratácie hlúž.
- Znižujte teplotu v režime schladzovania o 0,5 – 0,7°C denne až po dosiahnutie stálej teploty 5°C
- Skladovanie pri teplote nižšej ako 5°C môže spôsobiť nasladnutie hlúž.
- Pravidelne a krátko vetrajte – znížite koncentráciu CO₂.
- Každá zmena stabilnej skladovacej teploty spojená s kondenzáciou vody na hlúžach má za následok skoršie klíčenie a zvyšuje riziko výskytu striebrosti šupky.