



Pestovateľský návod – konzumné zemiaky

- veľmi skorá odroda s rýchlym rastom hľúz
- veľké hľuzy so svetločervenou šupkou
- úrodná odroda
- vyšší obsah sušiny
- vhodnosť na doma robené hranolčeky



Agronomický popis

Vegetačná doba	80 skorá
Dormancia	60 stredná
Úroda	94 dobrá
Veľkosť hľúz	83 veľká
Tvar hľúz	oválny
Počet hľúz pod trsom	9-11
Farba šupky	červená
Farba dužiny	svetložltá
Varný typ	B
Obsah sušiny/škrobu	20,2% / 14,3%
UWW/špecifická hmotnosť	369 / 1,079
Sivé škvrny v dužine	15 citlivá
Citlivosť na Sencor	65
Hľúzkovatenie	85



Šupka a farba dužiny



Varný typ



Vegetačná doba

Výsadba

Pre požadovanú veľkosť konzumných hľúz 40-65 (70) mm.

Hĺbka výsadby: bežná.

Veľkosť sadiva	počet jedincov/ha	75 cm	90 cm
28/35	46 000	29	24
35/45	43 000	31	26
35/55	42 000	32	26
50/55	40 000	33	28
55/65	38 000	35	29

Odporúčanie: pred výsadbou si urobte kalkuláciu počtu hľúz vo vreci/ big bagu.

Odolnosť chorobám a škodcom

Pleseň na vňati	26	●●●●●
Pleseň na hľuzách	56	●●●●●
Alternária	68	●●●●●
Obyčajná chrastavitosť	42	●●●●●
Prašná chrastavitosť	53	●●●●●
Tabakový rattle vírus	76	●●●●●
Vírus PVY na vňati	14	●●●●●
Vírus Y ^{NTN} na hľuzách	99	●●●●●

Háďatko zemiakové

Ro1/4 *2	●●●●●
Ro2/3 *2	●●●●●
Pa2 *2	●●●●●
Pa3 *2	●●●●●

Rakovinovec zemiakový

F1	8	●●●●●
F2	9	●●●●●
F6	9	●●●●●
F18		●●●●●

Výživa a hnojenie

Hnojenie prispôsobte výsledkom pôdneho rozboru.

N – Dusík: odporúčaná dávka je 250 kg N/ha vrátane pôdnej zásoby.

P – Fosfor: dbajte na dostatočnú zásobu P v pôde, čo má pozitívny vplyv na úrodu.

K – Draslík: dbajte na dostatočné hnojenie K, kvôli menšej odolnosti proti mechanickému poškodeniu.



Pestovateľský návod – konzumné zemiaky



Príprava sadiva a výsadba

- Odroda pomerne rýchlo klíči a vzhádza, preto stačí sadivo pred výsadbou len zohriať. Predklíčenie sadiva urýchli zber.
- Vyhýbajte sa pôdam, ktoré sú zamorené chrastavitosťou a tiež pôdam, ktoré rýchlo vysychajú. V prípade výsadby na takéto parcely, nezabudnite na pravidelnú závlahu v čase nasadzovania hľúz.
- Pri výsadbe odporúčame aplikovať prípravky proti koreňomoru.




Pestovanie

- Odroda je stredne citlivá na Sencor, pri postemergentnom ošetroení použite nižšie dávky.
- Vňať rýchlo rastie a je stredne vysoká. Rastlina vytvára menej hľúz, ktoré však rýchlo dorastajú do konzumnej veľkosti.
- Odporúčame začať včas s preventívnou ochranou proti plesni zemiakovej.



Ukončenie vegetácie a zber

- Dbajte na dobré vyzretie šupky pred zberom.
- Vzhľadom na väčšie hľuzy a citlivosť odrody na výskyt sivých škvrn v dužine, odporúčame citlivý zber s dôrazom na minimalizáciu pádovej výšky pri zbere a pozberovej úprave.



Skladovanie

- Odroda sa dobre skladuje.
 - Dbajte na rýchle osušenie hľúz po zbere, čo zníži riziko vzniku striebrosti šupky.
- Odporúčanie pre KLIMATIZOVANÉ SKLADY
- Rozdiel teploty chladenia a teploty hľúz by nemal byť väčší ako 4°C. V opačnom prípade sa zvyšuje riziko dehydratácie hľúz.
 - Znižujte teplotu v režime schladzovania o 0,5-0,7°C denne až po dosiahnutie stálej teploty 5°C. Nižšie teploty môžu spôsobiť nasladnutie hľúz. Pravidelne a krátko vetrajte – znížite koncentráciu CO₂.
 - Každá zmena stabilnej skladovacej teploty spojená s kondenzáciou vody na hľuzách má za následok skoršie klíčenie a zvyšuje riziko výskytu striebrosti šupky.