

RED SCARLETT

ZPC 80 O239 X MANS.MGB78-286



HZPC
keeps you growing

Pestovateľský návod – konzumné zemiaky

- veľmi skorá odroda s rýchlym rastom hľúz
- veľké hľuzy
- vysoké úrody pri skorom zbere
- vyrovnané hľuzy
- dobrá konzumná kvalita



Agromický popis

Vegetačná doba	75 veľmi skorá
Dormancia	55 stredne krátka
Úroda	96 dobrá
Veľkosť hľúz	80 veľká
Tvar hľúz	oválny-dlhooválny
Počet hľúz pod trsom	9-11
Farba šupky	červená
Farba dužiny	žltá
Varný typ	AB
Obsah sušiny / škrobu	18,4% / 12,6%
UWW/špecifická hmotnosť	333 / 1,071
Sivé škvrny v dužine	10 málo citlivá
Citlivosť na Sencor	64 ●●●●●●●●●●
Hľúzkovatenie	75 ●●●●●●●●●●



Šupka a farba dužiny



Varný typ



Vegetačná doba

Výsadba

Pre požadovanú veľkosť konzumných hľúz 40-65 (70) mm.

Hĺbka sadenia: normálna.

Veľkosť sadiva	počet jedincov/ha	75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	46 000	29	24
35/55	43 000	31	26
50/55	39 000	34	28
55/65	36 000	37	31

Odporúčanie: pokiaľ preferujete väčšie sadivové hľuzy vysádzajte redšie. Pred výsadbou si vždy urobte kalkuláciu počtu hľúz vo vreci/ big bagu.

Odolnosť chorobám a škodcom

Pleseň na vňati	43	●●●●●●●●●●
Pleseň na hľuzách	57	●●●●●●●●●●
Alternária	69	●●●●●●●●●●
Obyčajná chrastavitosť	57	●●●●●●●●●●
Prašná chrastavitosť	60	●●●●●●●●●●
Tabakový rattle vírus	75	●●●●●●●●●●
Vírus PVY na vňati	22	●●●●●●●●●●
Vírus YNTN na hľuzách	81	●●●●●●●●●●

Hádatko zemiakové	Rakovinovec zemiakový
Ro1/4 9 ●●●●●●●●●●	F1 10 ●●●●●●●●●●
Ro2/3 *3 ●●●●●●●●●●	F2 3 ●●●●●●●●●●
Pa2 ●●●●●●●●●●	F6 ●●●●●●●●●●
Pa3 ●●●●●●●●●●	F18 ●●●●●●●●●●

Výživa a hnojenie

N – Dusík: pri pestovaní na neskorší zber odporúčaná dávka N je cca 250 kg/ha vrátane pôdnej zásoby, v tom prípade je vhodné uplatniť delenú aplikáciu. Pri pestovaní na skorý zber je odporúčaná jednorazová dávka N cca 200 kg/ha vrátane pôdnej zásoby.

P – Fosfor: dbajte na dostatočnú zásobu v pôde.

K – Draslík: dbajte na dostatočnú zásobu v pôde.

RED SCARLETT

ZPC 80 O239 X MANS.MGB78-286



HZPC
keeps you growing

Pestovateľský návod – konzumné zemiaky



Príprava sadiva a výsadba

- RED SCARLETT je vhodná do všetkých typov štruktúrnych pôd.
- Hľuzy pred výsadbou odporúčame vždy otepliť, najlepšie k výsadbe sú napučané hľuzy s malými bielymi klíčkami pod 5 mm.
- Hľuzy pred výsadbou odporúčame vždy ošetriť moridlom proti koreňomorke.
- Odroda dobre znáša krájanie hľúz.
- Pre dosiahnutie vysokej kvality šupky odporúčame pri výsadbe aplikovať fungicíd azoxystrobin (Amistar), ktorý potláča rozvoj striebrosti na šupke hľúz.




Pestovanie

- Odroda je stredne citlivá na Sencor, pri postemergentnom ošetrovaní použite nižšie dávky.
- Vzchádzanie je pomerne rýchle, rastliny majú dobrú pokrývnosť pôdy.
- Vzhľadom k vyššej citlivosti dbajte na včasnú a pravidelnú ochranu proti plesni zemiakovej.
- Odroda je náchylnejšia na alternáriu. Použite fungicídy účinné proti alternárii, tieto aplikujte od fázy tvorby kvetných pukov.
- V ročníkoch s nevyrovnanými zrážkami, resp. závlahou, odroda reaguje vyššou citlivosťou na hrdzavosť dužiny, vtedy odporúčame predčasné ukončenie vegetácie a skorší zber.



Ukončenie vegetácie a zber

- RED SCARLETT je odolná proti vonkajšiemu i vnútornému mechanickému poškodeniu hľúz.
- Pri zbere správne vyzretých hľúz by nemalo dochádzať k ich poškodeniu.
- So zberom počkajte pokiaľ nie je šupka dostatočne pevná a vyzretá.



Skladovanie

- RED SCARLETT je dobre skladovateľná.
- Pravidelne a krátko vetrajte pre zníženie koncentrácie CO₂.
- Kolísanie skladovacej teploty v kombinácii s kondenzáciou vody na hľuzách má za následok skoršie klíčenie a zvyšuje riziko šírenia striebrosti šupky.