




Pestovateľský návod – lupienkové zemiaky

- vysoký obsah sušiny
- vhodnosť na skorý zber
- výborná kvalita lupienkov
- stabilne nízky obsah redukujúcich cukrov
- vhodnosť na skladovanie



Agronomický popis

Vegetačná doba	65 stredne skorá
Dormancia	107 veľmi dlhá
Úroda	92 dobrá
Veľkosť hľúz	78 stredná
Tvar hľúz	guľato oválny
Počet hľúz pod trsom	9-11
Farba šupky	žltá
Farba dužiny	svetložltá
Varný typ	BC
Obsah sušiny/škrobu	24,8% / 18,8%
UWW/špecifická hmotnosť	464 / 1,101
Sivé škvrny v dužine	18 citlivá
Citlivosť na Sencor	66
Hľúzkovatenie	90



Šupka a farba dužiny



Varný typ



Vegetačná doba

Výsadba

Pre požadovanú veľkosť hľúz 40-85 mm.

Hĺbka sadenia normálna.

Veľkosť sadiva	počet jedincov/ha	75 cm	90 cm
28/35	65 000	21	17
35/50	54 000	25	21
45/55	48 000	28	23
35/55	50 000	27	22
50/60 krájané	58 000	23	19

Pred výsadbou si urobte kalkuláciu počtu hľúz vo vreci/big bagu.

Odolnosť chorobám a škodcom

Pleseň na vňati	49	●●●●●●●●
Pleseň na hľuzách	57	●●●●●●●●
Alternária	50	●●●●●●●●
Obyčajná chrastavitosť	48	●●●●●●●●
Prašná chrastavitosť	54	●●●●●●●●
Tabakový rattle vírus	91	●●●●●●●●
Vírus PVY na vňati	76	●●●●●●●●
Vírus Y ^{NTN} na hľuzách	99	●●●●●●●●
Háďatko zemiakové		
Ro1/4	9	●●●●●●●●
Ro2/3	9	●●●●●●●●
Pa2	7	●●●●●●●●
Pa3		●●●●●●●●
Rakovinovec zemiakový		
F1	10	●●●●●●●●
F2	*5	●●●●●●●●
F6	*1	●●●●●●●●
F18		●●●●●●●●

Výživa a hnojenie

Odporúčanie: dávky živín aplikujte na základe výsledkov pôdneho rozboru.

N – dusík: aplikujte bežnú dávku N/ha pre stredne skoré odrody vrátane pôdnej zásoby. 2/3 dávky N aplikujte pri výsadbe a 1/3 na začiatku kvitnutia.

P - fosfor: dbajte na dostatočnú zásobu v pôde, čo má pozitívny vplyv na úrodu. Vyššie dávky P napomáhajú tvorbe silnej koreňovej sústavy.

K – draslík: dbajte na dostatočnú zásobu v pôde, čo má pozitívny vplyv na úrodu. Dostupnosť K v pôde znižuje citlivosť odrody na výskyt sivých škvŕn v dužine.



Pestovateľský návod – lupienkové zemiaky



Príprava sadiva a výsadba

- TRIPLE7 má veľmi dlhú dormanciu.
- Sadivo pred výsadbou zohrejte – prelomíte dormanciu.
- Ak sa na sadivových hľuzách objavajú apikálne klíčky, tak ich odstráňte a s výsadbou počkajte, pokiaľ sa na hľuzách neobjavia malé biele klíčky.
- Sadivo pred výsadbou vždy vyberte z klimatizovaného skladu a zohrejte.
- Sadivo vždy ošetríte prípravkami proti koreňomoru.
- Najlepšie výsledky dosahuje TRIPLE7 na úrodných stredne ťažkých štruktúrnych pôdach.
- Vyhýbajte sa pôdam s výskytom obvyčajnej chrastavosti.
- Vyhýbajte sa pôdam s výskytom prašnej chrastavosti.
- Výsadba sadivových hľúz s malými bielymi klíčkami, ale najmä predklíčenie sadiva pozitívne vplýva na vývin porastu.




Pestovanie

- Začiatok tvorby hľúz je rýchly.
- TRIPLE7 má pomalšie vzchádzanie, ale vŕňať rastie intenzívne, najmä v neskoršom období vývinu porastu.
- TRIPLE7 je citlivejšia na metribuzin (Sencor). Uprednostňujte aplikáciu pred vzídením rastlín.
- Dbajte na silnú preventívnu ochranu proti plesni zemiakovej na vŕňati aj na hľuzách.
- Odroda je citlivejšia na Alternáriu. S ošetrovaním začnite vždy preventívne v období kvitnutia.
- Ku koncu vegetácie preferujte prípravky proti plesni so silným ochranným účinkom na hľuzách.
- TRIPLE7 je citlivejšia na obvyčajnú chrastavosť. V prípade pestovania na pozemkoch s rizikom výskytu obvyčajnej chrastavosti, pravidelne zavlažujte už od začiatku tvorby hľúz.



Ukončenie vegetácie a zber

- TRIPLE7 je citlivá na výskyt sivých škvrn v dužine a mechanické poškodenie pri zbere.
- Šupka musí byť pred zberom plne vyzretá.
- Znížte rýchlosť preosievacích pásov na kombajne a dbajte na minimalizáciu pádových výšok pri zbere.



Skladovanie

- TRIPLE7 má dlhú dormanciu a dobre sa skladuje.
- Dodržiavajte obdobie pre zahojenie rán po zbere.
- Po zbere hľuzy rýchlo presušte ventiláciou a udržiavajte šupku suchú, čo pomôže predchádzať výskytu striebrosti šupky.
- Skladujte pri teplote 8°C.
- Pri dlhodobom skladovaní aplikujte prípravky proti klíčeniu hľúz.