



Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- Bardzo dobre walory smakowe
- Wysoki plon
- Ciemnożółty miąższ
- Wysoka liczba bulw
- Zwięzły miąższ po gotowaniu
- Odmiana sałatkowa oraz z przeznaczeniem na Baby Potatoes



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	76	Wczesna
Okres spoczynku	50	Średnio-krótki
Plon	100	Wysoki
Wielkość bulw	72	Średnia
Kształt bulw		Okrągło-owalne
Ilość bulw		18-22
Kolor skórki		Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu		Ciemnożółty
Typ kulinarny		A - Zwięzła
Sucha masa/Skrobia		19% / 13,1%
UWW/Ciężar właściwy		345 / 1,073
Uszkodzenia wewnętrzne	3	Niewrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	54	Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

Plon handlowy: 35-60 mm.

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
35/50	38.000	35	32

Głębokość sadzenia: normalna.
W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	35	● ● ● ● ● ●
Zaraza bulw	76	● ● ● ● ● ●
Alternarioza	40	● ● ● ● ● ●
Parch zwykły	54	● ● ● ● ● ●
Parch prószysty	48	● ● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	93	● ● ● ● ● ●
PVY	36	● ● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	99	● ● ● ● ● ●

Odporność na PCN

Ro1 *9	● ● ● ● ● ●
Ro2/3 *3	● ● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ● ●

Rak ziemniaka

F1 9	● ● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ● ●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Dostosuj nawożenie do analiz gleby.
- Azot (N): 150-160 kg/ha (łączenie z Nmin).
- Zastosuj 2/3 przed sadzeniem oraz 1/3 przed kwitnieniem
- Zaleca się stosowanie składników odżywczych o powolnym uwalnianiu, ponieważ pomaga w dłuższym utrzymywaniu sezonu wegetacyjnego.
- Nawożenie potasem (chlorek) należy wykonać min. 6 tygodni przed sadzeniem.



Ogólne porady dotyczące upraw



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- LA VIE ma średni stan spoczynku.
- Przed sadzeniem należy ogrzać sadzeniaki do temp. 10°C
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy. Stosowanie środków zawierających azoxystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed wieloma chorobami grzybowymi.
- LA VIE może być uprawiana na wszystkich typach gleby.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami obsady roślin, ponieważ LA VIE osiąga dużą liczbę bulw pod krzakiem.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- LA VIE ma równomierne wschody ale żeby zapewnić dobry rozwój liści, należy w początkowej fazie zastosować wysoką dawkę azotu.
- Stosowanie metrybuzyny zalecane jest przed wschodami. Przy użyciu po wschodach, należy zmniejszyć dawkę. Warunki pogodowe mają silny wpływ na działanie metrybuzyny. Dostosuj dawkę do okoliczności.
- Zalecamy nawadnianie odmiany LA VIE aby uzyskać jednolity plon.
- Zastosuj solidną ochronę przed zarazą ziemniaczaną.



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- Aby uzyskać dobrą dojrzałość i jakość plonu, należy dążyć do uzyskania 18% suchej masy.
- LA VIE posiada cieką skórkę. Należy zwrócić szczególną uwagę na dojrzałość skórki przed zbiorami.



Przechowywanie

- Chłodzenie jest wymagane w przypadku przechowywania dłuższego niż 4 miesiące.
- Wszelkie wahania temperatury w połączeniu z kondensacją mogą powodować wczesne kiełkowanie oraz wysokie ryzyko parcha srebrzystego.
- Do długotrwałego przechowywania, niezbędne jest stosowanie produktów powstrzymujących kiełkowanie.