




Zalecenia produkcyjne–ziemniak wczesny

- **Bardzo silna odmiana**
- **Wczesna tuberyzacja i dojrzałość**
- **Bulwy wyrównane o dużych rozmiarach**
- **Jasno żółta skórka**
- **Zalecana do uprawy na wczesny zbiór**



Charakterystyka odmiany


Dojrzałość	83 Bardzo wczesna
Okres spoczynku	66 Średni
Plon	86 Wysoki
Wielkość bulw	83 Duże
Kształt bulw	Owalne
Liczba bulw	9-11
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu	Jasno-żółty
Typ kulinarny	AB-Lekko zwięzły
Sucha masa/Skrobia	18,3% / 12,5%
UWW/Ciężar właściwy	332 / 1,07
Uszkodzenia wewnętrzne	9 Nie wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	59 Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

Plon handlowy: 30-75 mm.

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	60.000	22	19
35/45	50.000	27	22
45/55	42.000	32	26
35/55	44.000	30	25
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Głębokość sadzenia: 2 cm poniżej poziomu gruntu.
W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50 kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	33	● ● ● ● ●
Zaraza bulw	66	● ● ● ● ●
Alternarioza	52	● ● ● ● ●
Parch zwykły	46	● ● ● ● ●
Parch prószysty	54	● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	95	● ● ● ● ●
PVY	18	● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	88	● ● ● ● ●

Odporność na PCN

Ro1/4 9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Rak ziemniaka

F1	*2	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6	*9	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Dostosuj nawożenie do analizy gleby.
- Azot (N) w uprawie na wczesny zbiór: 150 kg N/ha (wliczając zawartość w glebie) w jednej aplikacji przed sadzeniem
- Nawożenie potasem i fosforanem zgodnie z standardowymi zaleceniami



Ogólne porady dotyczące uprawy



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- Przed posadzeniem należy ogrzać sadzeniaki do temperatury 10°C.
- W uprawie na bardzo wczesny zbiór zaleca się odpowiednio podkietkować sadzeniaki.
- Nie należy dopuszczać do obłamywania kielków w trakcie procesu sadzenia.
- Na ciężkich glebach potrzebna jest dobra struktura, aby uniknąć zniekształconych bulw.
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy.
- Stosowanie środków zawierających azoxystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed rizkotoniozą.



Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Wschody są jednolite, z dobrym i szybkim rozwojem części nadziemnej
- W przypadku ryzyka wystąpienia parcha zwykłego, zaleca się nawadnianie w okresie tuberyzacji.
- Należy zastosować solidną ochronę przed zarzą ziemniaczaną.



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- ADORA wczesnie dojrzewa i niszczenie naci nie stanowi problemu.
- ADORE można zbierać po 75-90 dniach.
- Bulwy rosną głęboko w redlinach.
- Aby zachować jasną i gładką skórkę, nie należy pozostawić bulw zbyt długo w glebie po

