



Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- **Żółty miąższ**
- **Regularna wielkość i kształt bulw**
- **Dobra tolerancja na suszę i warunki stresowe**
- **Odmiana doceniona i preferowana przez firmy paczkujące ziemniaki**
- **Wysoki plon**
- **Odmiana przydatna do długiego przechowywania**



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	67	Średnio wczesna
Okres spoczynku	61	Średni
Plon	99	Wysoki
Wielkość bulw	79	Średnia
Kształt bulw		Okrągło-owalne
Liczba bulw		15-17
Kolor skórki		Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu		Ciemnożółty
Typ kulinarny		AB – lekko mączysty
Sucha masa/Skrobia		19,9% / 14%
UWW/Ciężar właściwy		364 / 1,078
Uszkodzenia wewnętrzne	10	Lekko wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	70	Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/55	44.000	30	25
55/60	36.000	37	31

Głębokość sadzenia: normalna.

W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	43	● ● ● ● ●
Zaraza bulw	62	● ● ● ● ●
Alternarioza	49	● ● ● ● ●
Parch zwykły	67	● ● ● ● ●
Parch prószysty	56	● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	97	● ● ● ● ●
PVY	46	● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	99	● ● ● ● ●

Odporność na PCN

Ro1	8	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1		● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Rak ziemniaka

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Należy dostosować nawożenie do analiz gleby.
- Azot (N): 150-160 kg/ha (łącznie z Nmin)
- (N) zastosuj 2/3 przed sadzeniem oraz 1/3 przed kwitnieniem
- Fosfor (P2O5): 130-150 kg/ha
- Potas (K2O) 240-250 kg/ha



Ogólne porady dotyczące upraw



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- NOBLESSE ma średni okres spoczynku.
- Przed posadzeniem należy ogrzać sadzeniaki do temperatury 10°C.
- Zaprawianie bulw i gleby będzie zabezpieczać przed Roziktoniozą, parchem srebrzystym oraz innymi chorobami grzybowymi przenoszonymi w glebie. Azoksystrobina aplikowana na glebę daje dobre rezultaty w walce z chorobami grzybowymi.
- NOBLESSE może być uprawiana na wszystkich typach gleby.
- Należy sadzić kiedy sadzeniaki są pobudzone („otwarte oczka”)




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- NOBLESSE ma powolne wschody ale nać rozwija się intensywnie w późniejszym okresie.
- Stosowanie metrybuzyny zalecane jest przed wschodami. Przy użyciu po wschodach, należy zmniejszyć dawkę. Warunki pogodowe mają silny wpływ na działanie metrybuzyny. Dostosuj dawkę do okoliczności.
- Nawadnianie w okresie zawiązywania bulw może znacznie zwiększyć ich ilość.
- Zaleca się profilaktyczne i regularne zwalczanie zarazy ziemniaczanej.



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- Należy stosować środki o silnym działaniu na łodygi aby umożliwić łatwe oddzielanie się bulw od stolonów.
- Desykacja naci kiedy gleba jest bardzo przesuszona, może powodować brązowienie bulwy w miejscu połączenia ze stolonem.
- W normalnych warunkach NOBLESSE nie jest wrażliwe na obicia.



Przechowywanie

- NOBLESSE ma dobry okres spoczynku.
- Chłodzenie jest konieczne w przechowywaniu dłuższym niż 4 miesiące.
- Należy redukować temperaturę o 0,5 - 0,7°C na dzień, aż do uzyskania stabilnej temperatury, nie niższej niż 6°C
- Wentylować należy regularnie ale krótko, żeby zapobiec akumulacji CO₂.
- Wszelkie wahania temperatury połączone z kondensacją, zwiększają ryzyko kiełkowania oraz wystąpienia parcha srebrzystego.