



Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- Wczesna tuberyzacja i dojrzałość
- Wysoki plon
- Odmiana wszechstronna



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	64	Średnio-późna
Okres spoczynku	54	Krótki
Plon	110	Wysoki
Wielkość bulw	84	Duże
Kształt bulw		Owalne
Ilość bulw		9-11
Kolor skórki		Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu		Jasnożółty
Typ kulinarny		B – lekko mączysta
Sucha masa/Skrobia		21,2% / 15,3%
UWW/Ciężar właściwy		390 / 1,084
Uszkodzenia wewnętrzne	5	Niewrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	58	Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	20
35/55	43.000	32	27
55/60	36.000	37	32

Głębokość sadzenia: 3 cm głębiej niż normalnie.

W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg

Odporność na choroby

Zaraza liści	42	● ● ● ● ●
Zaraza bulw	65	● ● ● ● ●
Alternarioza	62	● ● ● ● ●
Parch zwykły	57	● ● ● ● ●
Parch prószysty	66	● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	94	● ● ● ● ●
PVY	98	● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	99	● ● ● ● ●

Odporność na PCN

Ro1	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	3	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3	*2	● ● ● ● ●

Rak ziemniaka

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*3	● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Dostosuj nawożenie do analiz gleby.
- Azot (N): 180-200kg/ha
- Zastosuj 2/3 przed sadzeniem oraz 1/3 w okresie zawiązywania bulw.
- Potas i fosfor w standardowych dawkach.



Ogólne porady dotyczące upraw



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- SAGITTA ma krótki okres spoczynku.
- Sadzeniaki należy przechowywać w chłodni aby zapobiec odwodnieniu.
- Przed sadzeniem należy ogrzać sadzeniaki do temp. 10°C. Należy sadzić kiedy sadzeniaki są pobudzone („otwarte oczka”).
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy. Stosowanie środków zawierających azoxystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed wieloma chorobami grzybowymi.
- Najlepsze rezultaty uzyskuje się na lekkich glebach.
- SAGITTA nie powinna być sadzona w zimną glebę.
- Należy zadbać o odpowiednie formowanie redlin.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Wschody roślin są równomierne z dobrym rozwojem naci ziemniaczanej.
- SAGITTA jest wrażliwa na metrybuzynę. Należy stosować tylko przed wschodami.
- SAGITTA jest mało odporna na alternariozę. Należy stosować dobry program ochrony.
- Zaleca się profilaktyczne i regularne zwalczanie zarazy ziemniaczanej.



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- Przed wykonaniem desykacji należy się upewnić, że ziemniaki są już wystarczająco dojrzałe. (sprawdzenie cukrów/suchej masy)
- SAGITTA ma duże bulwy. W czasie zbioru i załadunku do przechowalni, należy ograniczyć wysokość spadku do minimum, aby ograniczyć uszkodzenia i obicia



Przechowywanie

- SAGITTA ma krótki okres spoczynku. Do przechowywania, niezbędne jest stosowanie produktów powstrzymujących kiełkowanie.
- Przechowywać należy w stabilnej temperaturze ok. 6°C.
- Należy regularnie wentylować żeby zapobiec akumulacji CO₂.