



Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- Bardzo atrakcyjna błyszcząca skórka
- Regularny kształt i rozmiar bulw
- Wysoki plon
- Wczesna dojrzałość
- Dobra odporność na rizoktoniozę
- Bardzo dobrze sprawdzająca się w uprawie pod osłonami
- Odmiana doceniona i preferowana przez firmy paczkujące ziemniaki



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	84	Wczesna
Okres spoczynku	49	Krótki
Plon/wczesne/	97	Wysoki
Plon	99	Wysoki
Wielkość bulw	82	Duże
Kształt bulw		Owalne
Ilość bylw		12-15
Kolor skórki		Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu		Żółty
Typ kulinarny		A - Zwięzły
Sucha masa/Skrobia		16,7% / 10,9%
UWW/Ciężar właściwy		299 / 1,063
Uszkodzenia wewnętrzne	2	Mało wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	60	Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

Plon handlowy: 40-65 mm.

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/55	40.000	33	27

Głębokość sadzenia: Primabelle wiąże ziemniaki dosyć wysoko, dlatego należy sadzić ją nieco głębiej niż standardowo.

W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	24	● ● ● ● ●
Zaraza bulw	53	● ● ● ● ●
Alternarioza	90	● ● ● ● ●
Parch zwykły	64	● ● ● ● ●
Parch prószysty	59	● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	93	● ● ● ● ●
PVY	22	● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	99	● ● ● ● ●

Odporność na PCN	
Ro1	9 ● ● ● ● ●
Ro2/3 *3	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Wart disease	
F1	10 ● ● ● ● ●
F2	*5 ● ● ● ● ●
F6	*1 ● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Dostosuj nawożenie do analiz gleby.
- Azot (N): 100% w porównaniu do innych wczesnych odmian (ok. 180kg/ha)
- Nawożenie potasem (chlorek) należy wykonać min. 6 tygodni przed sadzeniem.
- Nawożenie fosforem w standardowych dawkach.
- Aplikację magnezu należy zastosować przed kwitnieniem.



Ogólne porady dotyczące upraw



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- PRIMABELLE ma krótki okres spoczynku.
- Przed posadzeniem należy ogrzać sadzeniaki do temperatury 10°C.
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy.
- Stosowanie środków zawierających azoxystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed chorobami grzybowymi roślin.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Stosowanie metrybuzyny zalecane jest przed wschodami. Przy użyciu po wschodach, należy zmniejszyć dawkę. Warunki pogodowe mają silny wpływ na działanie metrybuzyny. Dostosuj dawkę do okoliczności.
- Nawadnianie PRIMABELLE daje dobre efekty w wyrównaniu plonu i utrzymaniu wysokiej jakości bulw.
- Należy zastosować solidną ochronę przed zarazą ziemniaczaną.



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- PRIMABELLE może być zbierana po 90-100 dniach od wysadzenia w glebę.
- Po desykacji nie należy zbyt długo pozostawiać bulw w ziemi aby zachować dobrej jakości, błyszczącą skórkę.
- PRIMABELLE w normalnych warunkach jest odporna na obicia i siniaki.



Przechowywanie

- Po zbiorach należy szybko osuszyć ziemniaki i przechowywać je przez pierwsze dwa tygodnie w temperaturze ok 10-12°C
- PRZECHOWYWANIE W PRZECHOWALNI ZWYKŁEJ
- Należy redukować temperaturę o 0,5 - 0,7°C na dzień, aż do uzyskania stabilnej temperatury, nie niższej niż 5-6°C
- Wentylować należy regularnie ale krótko, żeby zapobiec akumulacji Co2.
- Wszelkie wahania temperatury połączone z kondensacją, zwiększają ryzyko kiełkowania oraz wystąpienia parcha srebrzystego.
- Do długotrwałego przechowywania, niezbędne jest stosowanie produktów powstrzymujących kiełkowanie.