





Zalecenia produkcyjne – ziemniak chipsowy

- **Dobry plon**
- **Niskie zapotrzebowanie na azot**
- **Wysoka jakość po wysmażeniu**
- **Dobra odporność na TRV**
- **Nadaje się do długotrwałego przechowywania**



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	65 Średnio wczesny
Okres spoczynku	56 Średni
Plon	102 Wysoki
Wielkość bulw	78 Średni
Kształt bulw	Okrągło-owalne
Liczba bulw	15-17
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu	Jasno-żółty
Typ kulinarny	B - Lekko mączysty
Sucha masa/Skrobia	22,5%/16,6%
UWW/Ciężar właściwy	417 / 1,09
Uszkodzenia wewnętrzne	9 Lekko wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	87 ● ● ● ● ●



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	34.000	35	30
50/60	34.000	39	33

Głębokość sadzenia: normalna

Odporność na choroby

Zaraza liści	47	● ● ● ● ●
Zaraza bulw	79	● ● ● ● ●
Alternarioza	62	● ● ● ● ●
Parch zwykły	52	● ● ● ● ●
Parch prószysty	57	● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	95	● ● ● ● ●
PVY	45	● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	99	● ● ● ● ●

Odporność na PCN

Ro1/4	5	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Pa2	6	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Rak ziemniaka

F1	9	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Dostosuj nawożenie do analizy gleby.
- Azot(N): 90% w porównaniu do innych średnio wczesnych odmian.
- Stosować 2/3 przed sadzeniem i 1/3 przed kwitnieniem.
- Azot(N): Średnie dawki (170-190Kg N/ha łącznie z azotem glebowym!)
- Nie stosować chlorku potasu (KCl) na mniej niż 6 tygodni przed sadzeniem. Zbyt późne stosowanie może mieć wpływ na zawartość suchej masy.
- Nawożenie fosforowe zgodne ze standardowymi zaleceniami.
- Zwróć uwagę na ilość nawozu organicznego, aby uniknąć późniejszej mineralizacji.



Ogólne porady dotyczące uprawy



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- Przechowuj ziemniaki w chłodni, aby zapobiec fizjologicznemu starzeniu się i odwodnieniu.
- Zaleca się zaprawiać ziemniaki i glebę przeciwko Rhizoctonia.
- Najlepsza jakość zostanie osiągnięta na żyznych i lekkich glebach.
- Wstępne kiełkowanie nie jest konieczne, Heraclea może być sadzona z małymi białymi kiełkami.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Wschody są wyrównane w standardowym terminie
- Zaleca się stosowanie metrybuzyny przed wschodami. Stosowanie metrabuzyny po wschodach jest możliwe lecz dawka uzależniona jest od fazy rozwojowej roślin oraz warunków pogodowych
- Zalecane jest podlewanie w suchych warunkach!
- Zaleca się stosowanie solidnego programu ochrony przeciwko Zarazie ziemniaka



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- Tylko dojrzała uprawa daje produkt nadający się do przechowywania.
- Skórka powinna być w pełni zaschnięta przed zbiorem.
- Nać ziemniaczana w większości przypadków nie wymaga desykacji.
- Zapobiegaj uszkodzeniom mechanicznym, aby ułatwić przechowywanie.



Przechowywanie

- Ze względu na krótki okres spoczynku należy zwrócić szczególną uwagę na przechowywanie.
- Zadbaj o okres suszenia oraz gojenia ran.
- Przechowywać w stabilnej temperaturze 8 °C.
- Wietrzyć regularnie, ale krótko aby zapobiec gromadzeniu się CO₂.
- Do długotrwałego przechowywania konieczne jest stosowanie inhibitorów kiełkowania.
- Przy pierwszym zastosowaniu inhibitorów kiełkowania zaleca się zastosować najwyższą z zalecanych dawek.