



Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- Odmiana wczesna
- Atrakcyjna lśniąca skórka
- Wysoki plon handlowy
- Wysoka zawartość suchej masy
- Wysoka odporność na parcha zwykłego



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	76 Wczesna
Okres spoczynku	63 Średni
Plon	109 Wysoki
Wielkość bulw	79 Średnie
Kształt bulw	Owalne
Liczba bulw	12-14
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu	Żółty
Typ kulinarny	AB - lekko zwięzły
Sucha masa/Skrobia	18,8% / 13%
UWW/Ciężar właściwy	342 / 1,073
Uszkodzenia wewnętrzne	6 Lekko wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	50 Wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	47.500	28	23
35/55	38.000	35	29
55/60	35.000	38	32

Głębokość sadzenia: normalna

Pomiędzy bulwą, a wierzchołkiem redliny powinno być +/- 20 cm (dla kalibrażu 35/55). W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	47	● ● ● ● ●
Zaraza bulw	53	● ● ● ● ●
Alternarioza	57	● ● ● ● ●
Parch zwykły	70	● ● ● ● ●
Parch prószysty	62	● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	97	● ● ● ● ●
PVY	42	● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	98	● ● ● ● ●

Odporność na PCN

Ro1/4 9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *6	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Rak ziemniaka

F1 3	● ● ● ● ●
F2	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Nawożenie należy dostosować do analiz gleby.
- Azot(N): średnie zapotrzebowanie (170-210Kg N/ha wliczając zawartość w glebie) Zastosuj 2/3 przed sadzeniem oraz 1/3 przed kwitnieniem.
- Nawożenie potasem oraz fosforem w standardowych zaleceniach dla odmian wczesnych podawane w jednej dawce przed sadzeniem.



Ogólne porady dotyczące uprawy



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- LIBRA ma średni okres uśpiania.
- LIBRA może być uprawiana na wszystkich typach gleb.
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko występowania Rizktoniozy ziemniaka.
- Stosowanie środków zawierających azoksystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed chorobami grzybowymi roślin oraz bulw.
- Sadzenie ziemniaków z "otwartymi oczkami" daje najlepsze efekty w rozwoju plantacji.
- Zaleca się sadzenie na nawadnianych plantacjach.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Stosowanie metrybuzyny zalecane jest przed wschodami. Przy użyciu po wschodach, należy zmniejszyć dawkę. Warunki pogodowe mają silny wpływ na działanie metrybuzyny – dostosuj dawkę do warunków polowych oraz atmosferycznych.
- Zaleca się utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby w celu uzyskania dobrej jakości oraz plonu.
- Należy stosować solidną ochronę przez zarazą ziemniaczaną.



Niszczanie naci ziemniaczanej i zbiór

- Należy zachować minimum 3 tygodnie po desykacji do rozpoczęcia zbiorów.
- Po desykacji nie należy jednak zbyt długo pozostawiać bulw w ziemi, aby zachować dobrej jakości błyszczącą skórę.
- Temperatura w trakcie zbiorów nie powinna przekraczać 25°C w celu zachowania odpowiedniej jakości skórki.



Przechowywanie

- LIBRA jest wczesną odmianą z możliwością przechowywania do 5 miesięcy po zbiorach
- Zaleca się utrzymanie odpowiedniego czasu suszenia oraz gojenia ran po załadowaniu ziemniaków do przechowalni.
- Należy redukować temperaturę o 0,5-0,7°C na dzień, aż do uzyskania stabilnej temperatury przechowywania.
- Zalecana temperatura przechowywania: 4°C.
- W celu zapewnienia dobrej prezentacji skórki, należy unikać niepotrzebnego narażania na światło.