



Zalecenia produkcyjne - ziemniak przemysłowy

- Duże i wyrównane bulwy
- Silna i stabilna nać
- Dobra zawartość suchej masy
- Wysoka odporność na TRV



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	66 Średnio wczesne
Stan spoczynku	76 Długi
Plon	104 Wysoki
Rozmiar bulw	83 Duży
Kształt bulw	Owalne/Długie owalne
Liczba bulw	9-11
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu po ugotowaniu	Jasno żółty
Typ kulinarny	B – Lekko mączysty
Sucha masa / skrobia	21,7% / 15,8%
UWW / Ciężar właściwy	400 / 1,086
Uszkodzenia wewnętrzne	17 Wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	73 Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/50	38.000	35	29
50/60	36.000	37	31
50/60 krojone	40.000	33	28

Gęstość sadzenia: normalna.

W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50 kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	52	●●●●●●
Zaraza bulw	74	●●●●●●
Alternarioza	59	●●●●●●
Parch zwykły	69	●●●●●●
Parch prószysty	63	●●●●●●
Plamistość miąższu	98	●●●●●●
PVY	99	●●●●●●
Tolerancja na Yntn	99	●●●●●●

Odporność na PCN

Ro1/4 9	●●●●●●
Ro1/4 4	●●●●●●
Ro1/4	●●●●●●
Ro1/4 *1	●●●●●●
Ro1/4	●●●●●●

Rak ziemniaka

F1 10	●●●●●●
F2 1	●●●●●●
F6 *1	●●●●●●
F18 *1	●●●●●●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Dostosuj nawożenie do analiz gleby.
- Azon (N): 210-250kg/ha (wliczając zawartość w glebie). Należy stosować 4/5 przed sadzeniem i 1/5 w drugiej dawce.
- K - 300-350 kg - formy KCl nie stosować poniżej 6 tygodni przed sadzeniem.
- P - zaleca się wysokie nawożenie fosforowe.



Ogólne porady dotyczące uprawy




Przygotowywanie sadzeniaków i sadzenie

- QUINTERA posiada długi okres spoczynku.
- Kielkowanie przyspiesza wzrost.
- Sadzeniaki należy zaaklimatyzować przed sadzeniem.
Nie zaleca się przechowywania sadzeniaków w temperaturze poniżej 5°C. Zaleca się stopniowe ogrzanie sadzeniaków przed sadzeniem.
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy.
- Stosowanie środków zawierających azoxystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed wieloma chorobami grzybowymi.
- QUINTERA może być uprawiana na wszystkich typach gleb, również z okresowymi niedoborami wody w trakcie sezonu wegetacyjnego.
- Podczas uprawy na ciężkich glebach należy zadbać o odpowiednią strukturę gleby.
- Zaleca się dobre uformowanie redliny w celu zapobiegania występowania zielonych bulw.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- QUINTERA charakteryzuje się wczesną tuberyzacją.
- Stosowanie metrybuzyny zalecane jest przed wschodami roślin. W aplikacji po wschodach zaleca się ograniczone dawki dostosowane do fazy rozwojowej rośliny
- Zabiegi przeciwko Zarazie ziemniaka zawsze wykonywać zapobiegawczo.



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- QUINTERA jest odmianą wczesną przez co desykacja roślinie nie powinna być problematyczna.
- Na plantację przeznaczoną do przechowywania zaleca się stosowanie produktu zawierającym hydrazyd maleinowy – produkt należy zastosować gdy najmniejsze bulwy są większe niż 28 mm, a część nadziemna jest jeszcze w pełni zielona
- QUINTERA jest podatna na obicia – należy ograniczyć możliwość powodowania obić w trakcie kopania oraz transportu bulw do i w przechowalni.



Przechowywanie

- Zadbaj o okres gojenia się ran w początkowym wentylowaniu zebranych bulw.
- Przechowywać w stabilnej temperaturze 8°C
- Zaleca się regularne wietrzenie w celu zabiegania występowania gnijących bulw.
- Quintera posiada długi okres uśpiania – Stosowanie inhibitorów kiełkowania przeznaczone jest tylko do bardzo późnych dostaw.