



Zalecenia produkcyjne - ziemniak przemysłowy

- Wysoki plon handlowy
- Wyrównany kształt wielkość bulw
- Wymagana długość bulw dla przetwórstwa



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	63 Średnio późna
Stan spoczynku	73 Długi
Plon	103 Wysoki
Rozmiar bulw	79 Umiarkowany
Kształt bulw	Długie owalne
Liczba bulw	12-14
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu po ugotowaniu	Jasno żółty
Typ kulinarny	B – Lekko mączysty
Sucha masa / skrobia	23% / 17%
UWW / Ciężar właściwy	426 / 1,092
Uszkodzenia wewnętrzne	14 Średnia wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	65 Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	38.000	35	29
35/50	36.000	37	31
45/50	34.000	39	33
50/60	32.000	42	35
50/60 krojone	38.000	35	29

Gęstość sadzenia: 3 cm głębiej niż normalnie.
W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50 kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	50	●●●●●
Zaraza bulw	70	●●●●●
Alternarioza	71	●●●●●
Parch zwykły	62	●●●●●
Parch prószysty	62	●●●●●
Plamistość miąższu	99	●●●●●
PVY	59	●●●●●
Tolerancja na Yntn	99	●●●●●

Odporność na PCN

Ro1/4	●●●●●
Ro2/3	●●●●●
Ro5	●●●●●
Ro2	●●●●●
Ro3	●●●●●

Rak ziemniaka

F1	8	●●●●●
F2		●●●●●
F6		●●●●●
F18		●●●●●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Dostosuj nawożenie do analiz gleby.
- Azon (N): 210-250kg/ha (wliczając zawartość w glebie). Należy stosować 2/3 przed sadzeniem i 1/3 w drugiej dawce.
- K - 300-350 kg - formy KCl nie stosować poniżej 6 tygodni przed sadzeniem.
- P - zaleca się wysokie nawożenie fosforowe.



Ogólne porady dotyczące uprawy



Przygotowywanie sadzeniaków i sadzenie

- TRAVOLTA posiada długi okres spoczynku.
- Sadzenie bulw pobudzonych z "otwartymi" oczkami przyspiesza wschody roślin.
- Zaleca się dobre uformowanie redliny w celu zapobiegania występowania zielonych bulw.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- TRAVOLTA jest wrażliwa na alternariozę ziemniaka.
- Zaleca się stosowanie silnego programu ochrony przeciwko tej chorobie ziemniaka, rozpoczynając aplikacje już przed kwitnieniem roślin.
- Zabiegi przeciwko Zarazie ziemniaka zawsze wykonywać zapobiegawczo.



Niszczanie naci ziemniaczanej i zbior

- Travolta ma silną nać – zaleca się wykonanie desykacji w celu wyrównania dojrzałości bulw na plantacji
- TRAVOLTA jest średnio podatna na obicia – należy ograniczyć możliwość powodowania obić w trakcie kopania oraz transportu bulw do i w przechowalni



Przechowywanie

- Zadbaj o okres gojenia się ran w początkowym wentylowaniu zebranych bulw
 - Przechowywać w stabilnej temperaturze 7°C
 - Travolta posiada długi okres uśpienia – Stosowanie inhibitorów kiełkowania przeznaczone jest tylko do bardzo późnych dostaw.
- Prawidłowe zarządzanie przechowywaniem pozwala na długie i stabilne utrzymanie TRAVOLTY