




Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- **Bardzo atrakcyjna lśniąca skórka**
- **Wysoki plon**
- **Wczesna tuberyzacja**
- **Kremowy miąższ**



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	55	Późna
Okres spoczynku	59	Średni
Plon	115	Wysoki
Wielkość bulw	82	Duże
Kształt bulw		Okrągło-owalne
Ilość bulw		12-14
Kolor skórki		Jasnożółty
Kolor miąższu po gotowaniu		Kremowy
Typ kulinarny		AB
Sucha masa/Skrobia		19,6% / 13,7%
UWW/Ciężar właściwy		357 / 1,076
Uszkodzenia wewnętrzne	12	Nieco wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	85	Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	53.500	25	20
35/55	44.500	30	25
55/60	39.000	34	31

Głębokość sadzenia: normalna.

W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	55	● ● ● ● ●
Zaraza bulw	78	● ● ● ● ●
Alternarioza	65	● ● ● ● ●
Parch zwykły	56	● ● ● ● ●
Parch prószysty	50	● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	63	● ● ● ● ●
PVY	34	● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	95	● ● ● ● ●

Odporność na PCN

Ro1	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Pa2	*6	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Rak ziemniaka

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*2	● ● ● ● ●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Należy dostosować nawożenie do analiz gleby.
- Azot (N): ok. 180 kg/ha (wliczając zawartość w glebie)
- Zastosuj 2/3 przed sadzeniem and 1/3 przed kwitnieniem.
- Na glebach ubogich w potas, zastosuj nawóz na bazie chlorku (KCl) tuż przed sadzeniem aby ograniczyć wrażliwość bulw na obicia.
- Nawożenie fosforem w standardowych dawkach.



Ogólne porady dotyczące upraw




Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- SIFRA może być uprawiana na wszystkich typach gleby.
- Na ciężkich glebach trzeba zadbać o dobrą strukturę żeby uniknąć zniekształconych bulw.
- Należy sadzić kiedy sadzeniaki są pobudzone („otwarte oczka”)
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy.
- Stosowanie środków zawierających azoksystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed chorobami grzybowymi roślin.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Należy zastosować solidną ochronę przeciw Alternaria solani oraz Alternaria alternata.
- Zaleca się profilaktyczne i regularne zwalczanie zarazy ziemniaczanej.



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- Przed zbiorem ziemniaków należy upewnić się, że skórka jest już wystarczająco dojrzała.
- SIFRA ma stosunkowo wysoką suchą masę. Należy unikać zbyt niskich oraz zbyt wysokich temperatur podczas zbioru aby zapobiegać obiciom.
- W czasie zbioru i załadunku do przechowalni, należy ograniczyć wysokość spadku do minimum, aby ograniczyć uszkodzenia i obicia



Przechowywanie

- SIFRA jest przydatna do długoterminowego przechowywania.
- SIFRA jest lekko podatna na Phoma i Fusarium. Należy zadbać o dokładne osuszenie bulw po zbiorach aby zapewnić dobre przechowywanie. Zbyt szybkie obniżenie temperatury, bez wystarczającego okresu osuszania i gojenia ran, może mieć negatywne rezultaty.
- Wszelkie wahania temperatury połączone z kondensacją, zwiększają ryzyko kiełkowania oraz wystąpienia parcha srebrzystego.