





Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- Wyrównany rozmiar i kształt bulw
- Wysoki plon
- Atrakcyjna skórka i wysokie walory smakowe
- Dobra odporność na parcha zwykłego
- Odmiana przydatna do długiego przechowywania



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	68 Średnio wczesna
Okres spoczynku	102 Bardzo długi
Plon	109 Wysoki
Wielkość bulw	83 Duże
Kształt bulw	Owalne
Liczba bulw	9-11
Kolor skórki	Ciemno żółty
Kolor miąższu po gotowaniu	Ciemno żółty
Typ kulinarny	AB – lekko zwięzły
Sucha masa/Skrobia	18,2% / 12,4%
UWW/Ciężar właściwy	330 / 1,07
Uszkodzenia wewnętrzne	9 Lekko wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	79 Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	47.500	28	23
35/45	44.000	30	25
35/50	42.000	32	26
50/55	37.000	36	30

Głębokość sadzenia: normalna.

W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	57	●●●●●
Zaraza bulw	71	●●●●●
Alternarioza	63	●●●●●
Parch zwykły	65	●●●●●
Parch prószysty	63	●●●●●
Plamistość miąższu	99	●●●●●
PVY	97	●●●●●
Tolerancja na Yntn	99	●●●●●

Odporność na PCN

Ro1/4 9	●●●●●
Ro2/3 *4	●●●●●
Pa2	●●●●●
Pa3	●●●●●

Rak ziemniaka

F1 9	●●●●●
F2 *5	●●●●●
F6 *5	●●●●●
F18 *1	●●●●●

* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Nawożenie należy dostosować do analiz gleby.
- Azot (N): 150-200 kg/ha (wliczając zawartość N w glebie)
- Potas (K): 200-250 kg/h (wliczając zawartość w glebie)
- Fosfor (P): wysoki poziom fosforu ma dobry wpływ na rozwój systemu korzeniowego i odpowiednie zawiązanie bulw



Ogólne porady dotyczące uprawy




Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- CAMELIA posiada bardzo długi okres spoczynku
- Nie zaleca się przechowywania sadzeniaków w temperaturze poniżej 5°C.
- Przed sadzeniem należy ogrzać sadzeniaki do temperatury ok. 10°C
- Zaleca się sadzenie ziemniaków pobudzonych („otwarte oczka”).
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy.
- Stosowanie środków zawierających azoksystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed rizkotoniozą ziemniaka.
- CAMELIA może być uprawiana na wszystkich typach gleb.
- Zaleca się odpowiednie zbudowanie redlin w celu zapobiegania występowania zielonych bulw.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Wschody są jednolite, z dobrym i szybkim rozwojem części nadziemnej.
- Stosowanie metrybuzyny zaleca się przed wschodami ziemniaka. Przy użyciu po wschodach, należy zmniejszyć dawkę. Warunki atmosferyczne mają silny wpływ na działanie tej substancji.
- Zaleca się profilaktyczne i regularne zwalczanie zarazy ziemniaka.



Niszczanie naci ziemniaczanej i zbiór

- Aby uzyskać maksymalny plon handlowy należy kontrolować wielkość bulw i dokonać niszczenia naci w optymalnym czasie.
- Wykonać zbiór przy w pełni wykształconej skórce na minimum 3 tygodnie po niszczeniu naci
- Przy zbiorze ziemniaków zaleca się ostrożne postępowanie z bulwami aby uniknąć obić



Przechowywanie

- CAMELIA jest przydatna do długiego przechowywania, bez konieczności stosowania produktów ograniczających kiełkowanie.
- Należy zadbać o odpowiednie osuszenie bulw i zagojenie ran.
- Wentylować należy regularnie ale krótko, żeby zapobiec akumulacji CO2
- Zalecana temperatura przechowywania to 4-5°C