



Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- Regularny kształt i rozmiar bulw
- Wysoki plon
- Duża zawartość suchej masy
- Dobra tolerancja na suszę
- Przydatna do przechowywania



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	64	Średnio późna
Okres spoczynku	88	Bardzo długi
Plon	98	Wysoki
Wielkość bulw	79	Średnie
Kształt bulw		Okrągło-owalne
Ilość bulw		12-14
Kolor skórki		Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu		Jasno żółty
Typ kulinarny		BC - mączysty
Sucha masa/Skrobia		23,3% / 17,3%
UWW/Ciężar właściwy		432 / 1,094
Uszkodzenia wewnętrzne	28	Bardzo wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	70	Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

Kalibraż	Obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	65.000	21	17
35/45	54.000	25	21
45/55	42.000	34	28
35/55	44.000	30	25
50/60 /krojone/	44.000	30	25

Głębokość sadzenia: normalna

W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	64	●●●●●●●●
Zaraza bulw	62	●●●●●●●●
Alternarioza	64	●●●●●●●●
Parch zwykły	58	●●●●●●●●
Parch prószysty	66	●●●●●●●●
Plamistość miąższu	85	●●●●●●●●
PVY	65	●●●●●●●●
Tolerancja na Yntn	99	●●●●●●●●

Odporność na PCN

Ro1	9	●●●●●●●●
Ro2/3	6	●●●●●●●●
Pa2	*1	●●●●●●●●
Pa3		●●●●●●●●

Rak ziemniaka

F1	3	●●●●●●●●
F2	6	●●●●●●●●
F6	6	●●●●●●●●
F18 *1		●●●●●●●●


* HZPC analizy własne

Nawożenie

- Należy dostosować nawożenie do analiz gleby.
- Azot (N): 160kg/ha (wliczając zawartość w glebie)
Zastosuj 2/3 przed sadzeniem i 1/3 tuż przed kwitnieniem.
- Fosfor(P): zgodnie z standardowymi zaleceniami ok. 150kg/ha,
- TAURUS jest wrażliwy na niedobór magnezu.



Ogólne porady dotyczące upraw



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- TAURUS ma długi okres spoczynku.
- Dominacja wierzchołkowa jest dość silna.
- Przed sadzeniem należy ogrzać sadzeniaki do temperatury ok 10°C.
- TAURUS należy sadzić kiedy sadzeniaki są pobudzone („otwarte oczka”).
- Zaprawianie bulw i gleby będzie zabezpieczać przed Roziktoniozą, parchem srebrzystym oraz innymi chorobami przenoszonymi w glebie. Azoxystrobina aplikowana na glebę daje dobre rezultaty w walce z chorobami grzybowymi.




Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Wschody są równomierne z dobrym rozwojem naci.
- Odmiana jest bardzo wrażliwa na metrybuzynę.
- TAURUS ma dobrą tolerancję na suszę.
- Zaleca się profilaktyczne i regularne zwalczanie zarazy ziemniaczanej i alternariozy.



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- Przed wykonaniem desykacji należy się upewnić, że ziemniaki są już wystarczająco dojrzałe. (sprawdzenie cukrów/suchej masy)
- Ze względu na wysoką zawartość suchej masy, TAURUS jest raczej wrażliwy na obicia.
- W czasie zbioru i załadunku do przechowalni, należy ograniczyć wysokość spadku do minimum, aby ograniczyć uszkodzenia i obicia



Przechowywanie

- TAURUS ma długi okres spoczynku nadaje się do długiego przechowania.
- Po zbiorach należy szybko osuszyć ziemniaki.
- By zachować dobrą jakość, należy przechowywać w temperaturze 10°C.
- Należy regularnie wentylować żeby zapobiec akumulacji CO₂.
- Do długotrwałego przechowywania, niezbędne jest stosowanie produktów powstrzymujących kiełkowanie.